

نام واکسن : آسترزنکا

کشور سازنده : کره جنوبی

نوع واکسن : ds DNA ویروس غیر فعال

تعداد دوز(تزریق): ۲ نوبت

فاصله بین دو نوبت : ۱۲ هفته

کاربرد گروه سنی : بالای ۱۸ سال

اثر بخشی واکسن: ۶۳٪

AstraZeneca



افرادی که نباید واکسن تزریق کنند :

- ◀ افرادی که سابقه واکنش های حساسیتی (آنافیلاکسی) دارند.
- ◀ افرادی که تب بالای ۳۸ درجه دارند
- ◀ افرادی که به دنبال تزریق نوبت اول دچار هر نوع عارضه شدید شده اند مصرف نوبت دوم واکسن را دارند.

افرادی که باید با احتیاط و با مشورت پزشک واکسن بزنند:

- در افرادی که مبتلا به بیماری خونریزی دهنده یا اختلال انعقادی (هموفیلی) هستند یا داروهای رقیق کننده خون (ضدانعقادی) مصرف می کنند، واکسیناسیون باید در ساعت های

اول پس از دریافت فاکتورهای انعقادی انجام شود و محل تزریق حدود ۳۰ دقیقه تحت فشار قرار داده شود.

- افرادی که ضعف سیستم ایمنی یا بیماری اتوایمیون دارند باید با پزشک معالج خود مشورت نمایند.

عوارض شایع واکسن :

عوارض موضعی مانند درد، گرمی و خارش محل تزریق، احساس کسالت عمومی، احساس خستگی، سرگیجه، تب و لرز، سردرد، تهوع، درد مفاصل یا عضلات

اقدامات لازم بعد از تزریق واکسن :

- بعد از دریافت واکسن تا ۳۰ دقیقه در مرکز بمانید.
- در صورت بروز علائم خفیف مانند درد، تب و آبریزش بینی از مسکن مانند استامینوفن یا آنتی هیستامین استفاده کنید و در صورت بروز عوارض **شدید** با مرکزی که واکسن تزریق شده تماس بگیرید.

سفیران سلامت تهران در فضای مجازی

@safiranesalamatetehran