

نام واکسن : سینوفارم

کشور سازنده : چین

نوع واکسن : ویروس غیر فعال

تعداد دوز (تزریق) : ۲ نوبت

فاصله بین دو نوبت : ۲۸ روز

کاربرد گروه سنی : بالای ۱۸سال

اثر بخشی واکسن : ۷۹٪

افرادی که نباید واکسن تزریق کنند :

← افرادی که سابقه آلرژی به این واکسن را دارند.

← افرادی که سابقه واکنش های حساسیتی و یا بیماری مزمن

شدید دارند.

← افرادی که دچار بیماری حاد متوسط تا شدید با یا بدون تب

هستند تا زمان بهبودی، ممنوعیت مصرف واکسن دارند.

← خانم ها در دوران بارداری و شیردهی

افرادی که باید با احتیاط و با مشورت پزشک واکسن بزنند :

← افراد مبتلا به اختلالات انعقادی و یا کاهش پلاکت خون، با نظر

پزشک معالج واکسیناسیون انجام دهند و بعد از تزریق واکسن

باید مراقب محل تزریق (از نظر خونریزی) باشند.

← افراد با بیماری هموفیلی، بعد از تزریق فاکتورانعقادی واکسن بزنند



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت بهداشت

SINOPHARM
(BBIPV-CorV)



عوارض واکسن :

عوارض خیلی شایع : درد محل تزریق

عوارض شایع : تب موقت، احساس ضعف، سردرد، اسهال، قرمزی،

سفتی، تورم و خارش محل تزریق

عوارض ناشایع : راش پوستی در محل تزریق، تهوع و استفراغ،

خارش در محل غیر از تزریق، درد عضلانی، درد مفاصل، خواب

آلودگی و گیجی

اقدامات لازم بعد از تزریق واکسن :

- بعد از دریافت واکسن تا ۳۰ دقیقه در مرکز بمانید.

- در صورت بروز علائم خفیف مانند درد، تب و آبریزش بینی

از مسکن مانند استامینوفن یا آنتی هیستامین استفاده کنید و

در صورت بروز عوارض **شدید** با مرکزی که واکسن تزریق شده

تماس بگیرید.

سفیران سلامت تهران در فضای مجازی

@safiranesalamatetehran